



# 頓服薬

## 頓服薬の服用方法

### 頓服药的服用方法

\_\_日分の薬が処方されています。

开了\_\_天的药。

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

在□中画有对号，请遵守该规定进行服用。

## 1回に服用する量

### 1次服用的量

1/2：この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2：有此标示时，请服用一半的量。

\_\_錠

\_\_片

\_\_カプセル

\_\_粒(胶囊)

\_\_包

\_\_包

\_\_個

\_\_个

## 服用する回数

### 服用次数

適時

必要的时候

医師の指示通り

遵照医生的指示

服用した後、次の使用まで\_\_時間空けてください。

在使用之后距离下次使用为止请间隔\_\_小时。





# 頓服薬

服用の上限は1日\_\_回です。

最多服用次数は1天\_\_次

## 服用する時期

服用时间

痛い時

疼痛时

痒い時

发痒时

下痢をしている時

腹泻时

心臓発作の時

心脏病发作时

吐き気がある時

觉得恶心时

咳が出る時

咳嗽时

喘息発作の時

哮喘病发作时

痛風発作の時

痛风病发作时

痛風発作の予感がする時

预感到痛风病要发作时

熱が38.5℃以上ある時

发烧在38.5℃以上时

必要な時

必要的时候



# 頓服薬

服用時注意してください。

服用时请注意。

PTP包装の薬剤は、PTPシートから取り出して服用してください。

服用 PTP 包装的药剂时，请从 PTP 膜中取出后进行服用。

グラス1杯（約200mL）の水で服用してください。

请用1杯(约200ml)水进行服用。

（口中・舌下）に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

请含服在嘴里、舌下，不要嚼碎，使其缓缓溶化。

よく振ってから服用してください。

请充分摇匀后服用。

子どもの手の届かないところに保存してください。

请保存在小孩触摸不到的地方。

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

请避免潮湿，保存在阴凉的场所。

室温保存してください。

请保存在室温中。

冷蔵庫の中で保存してください。

请保存在冷藏室中。

冷凍庫に入れないでください。

请不要放入冷冻室中。

