



# 頓服薬

## 頓服薬の服用方法

### Indicaciones de los medicamentos antipiréticos y analgésicos

\_\_日分の薬が処方されています。

Están recetados los medicamentos para \_\_\_\_ días.

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

Tómelos de acuerdo con las indicaciones marcadas en las casillas.

## 1回に服用する量

### Dosis

1/2：この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2：Esto indica que se toma la mitad del medicamento.

\_\_錠

\_\_ pastilla(s)

\_\_カプセル

\_\_ cápsula(s)

\_\_包

\_\_ sobre

\_\_個

\_\_ tableta(s)

## 服用する回数

### Número de veces para tomar

適時

Quando se necesite

医師の指示通り

Según la instrucciones del médico

服用した後、次の使用まで\_\_時間空けてください。

Después del uso, espere \_\_\_\_ horas antes del próximo uso.





# 頓服薬

服用の上限は1日\_\_回です。

No excede de \_\_\_\_ veces diarias.

## 服用する時期

Horario del medicamento

痛い時

Cuando tenga dolor

痒い時

Cuando tenga picor

下痢をしている時

Cunado tenga diarrea

心臓発作の時

Cuando tenga un ataque cardíaco

吐き気がある時

Cuando tenga náuseas

咳が出る時

Cuando tenga tos

喘息発作の時

Cuando tenga un ataque de asma

痛風発作の時

Cuando tenga un ataque de gota

痛風発作の予感がする時

Cuando prevea un ataque de gota

熱が38.5℃以上ある時

Cuando tenga fiebre más alto que 38.5℃

必要な時

Cunado necesario



服用時注意してください。

Tome las siguientes precauciones cuando aplique el medicamento.

PTP 包装の薬剤は、PTP シートから取り出して服用してください。

Respecto a los medicamentos envueltos en la película PTP,quítela antes de tomar.

グラス 1 杯 (約 200mL) の水で服用してください。

Tómese con un vaso(unos 200ml.) de agua.

(口中・舌下) に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

Colóquelo(en la boca,debajo de la lengua) y déjelo disolver lentamente sin masticarlos.

よく振ってから服用してください。

Agítelo bien antes de tomar.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Manténgase fuera del alcance de los niños.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Manténgase en un lugar seco y frío.

室温保存してください。

Manténgase a la temperatura ambiente.

冷蔵庫の中で保存してください。

Manténgase en el refrigerador.

冷凍庫に入れないでください。

No lo meta en el congelador.

