

ゴービック水性懸濁注シリンジ 副反応発現状況

集計期間：2024年3月15日～2025年1月31日

副反応の種類		自発報告 件数			使用成績調査 件数		
器官別大分類 (SOC)	基本語 (PT)	重篤	非重篤	合計	重篤	非重篤	合計
胃腸障害	下痢		3	3		1	1
	血便排泄		1	1			
	軟便		1	1			
	排便回数増加		1	1			
	腹痛		1	1			
	腹部膨満		1	1			
	変色便		1	1			
	便秘		1	1			
	嘔吐	1	7	8		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態	活動性低下		3	3			
	泣き		23	23			
	倦怠感		1	1			
	硬結		1	1			
	腫脹		5	5			
	腫瘤		1	1			
	注射部位硬結		16	16		17	17
	注射部位紅斑		24	24		26	26
	注射部位腫脹		45	45		18	18
	注射部位出血		1	1			
	注射部位熱感		4	4		2	2
	注射部位疼痛		17	17			
	乳児突然死症候群	1		1			
	発熱	8	340	348		61	61
疼痛		2	2				
感染症および寄生虫症	ヘモフィルス性髄膜炎	1		1			
	腎盂腎炎	1		1			
	中耳炎		1	1			
	百日咳		1	1			
	蜂巣炎	1	1	2			
眼障害	注視麻痺		1	1			
筋骨格系および結合組織障害	筋肉痛		1	1			
血液およびリンパ系障害	血小板減少性紫斑病	1		1			
	免疫性血小板減少症	1		1			
血管障害	チアノーゼ		1	1			
	蒼白	1	5	6			
	潮紅		3	3			
呼吸器、胸郭および縦隔障害	咽頭紅斑		2	2			
	咳嗽		2	2			
	低酸素症		1	1			
	鼻漏		2	2			
	無呼吸		2	2			
神経系障害	意識レベルの低下	1		1			
	過眠症		1	1			
	失神寸前の状態		1	1			
	振戦		1	1			
	熱性痙攣	2	1	3			
	痙攣発作		1	1			
精神障害	気分変化		4	4		1	1

副反応の種類		自発報告 件数			使用成績調査 件数		
器官別大分類 (SOC)	基本語 (PT)	重篤	非重篤	合計	重篤	非重篤	合計
代謝および栄養障害	食欲減退		10	10			
皮膚および皮下組織障害	紅斑	1	9	10			
	紫斑	1		1			
	湿疹		2	2			
	多汗症		2	2			
	点状出血		3	3			
	発疹		14	14			
	蕁麻疹		3	3			
免疫系障害	アナフィラキシー反応		3	3			
臨床検査	C-反応性蛋白増加		1	1			
総計		21	579	600	0	127	127

(MedDRA/J ver.27.1)