

ラジカット内用懸濁液2.1% 副作用発現状況

集計対象:2023年4月17日 ~ 2024年3月31日

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
食欲減退			2	2	2	2
過小食			1	1	1	1
代謝および栄養障害			3	3	3	3
中期不眠症			1	1	1	1
思考異常			1	1	1	1
精神障害			2	2	2	2
筋萎縮性側索硬化症	1	1			1	1
浮動性めまい	1	1	6	7	7	8
頭痛	1	1	1	1	2	2
感覚鈍麻			1	1	1	1
意識消失			1	1	1	1
運動機能障害			1	1	1	1
味覚障害			1	1	1	1
神経系障害	2	3	11	12	13	15
うっ血性心不全			1	1	1	1
動悸			1	1	1	1
心臓障害			2	2	2	2
静脈穿刺不良			1	1	1	1
ほてり			1	1	1	1
血管障害			2	2	2	2
息詰まり			1	1	1	1
咳嗽			1	1	1	1
鼻出血			1	1	1	1
湿性咳嗽			1	1	1	1
呼吸不全	2	2			2	2
鼻漏			1	1	1	1
喀痰増加			1	1	1	1
喉頭不快感			2	2	2	2
呼吸器、胸郭および縦隔障害	2	2	7	8	9	10
腹部膨満			1	1	1	1
上腹部痛			1	1	1	1
異常便			1	1	1	1
便秘			1	1	1	1
下痢			7	7	7	7
嚥下障害			1	1	1	1
胃腸出血	1	1			1	1
悪心	1	1	12	13	13	14
口腔内不快感			1	1	1	1
流涎過多			1	1	1	1
胃痙	1	1	2	2	3	3
軟便			3	3	3	3
胃腸障害	3	3	31	32	34	35
肝機能異常			6	6	6	6
肝胆道系障害			6	6	6	6

	重篤例		非重篤例		集計	
	例数	件数	例数	件数	例数	件数
脱毛症			2	2	2	2
冷汗			1	1	1	1
薬疹			5	5	5	5
湿疹			1	1	1	1
紅斑			2	2	2	2
そう痒症			2	2	2	2
発疹			3	3	3	3
蕁麻疹			2	2	2	2
皮膚および皮下組織障害			16	18	16	18
関節痛			1	1	1	1
筋力低下	1	1	1	1	2	2
筋肉痛			1	1	1	1
四肢痛			1	1	1	1
横紋筋融解症	2	2			2	2
筋骨格硬直			1	1	1	1
筋骨格系および結合組織障害	3	3	4	5	6	8
着色尿			1	1	1	1
尿臭異常			1	1	1	1
排尿回数減少			1	1	1	1
腎機能障害	1	1	3	3	4	4
腎および尿路障害	1	1	6	6	7	7
悪寒			2	2	2	2
死亡	2	2			2	2
冷感			1	1	1	1
歩行不能			1	1	1	1
倦怠感	1	1	7	7	8	8
末梢性浮腫			3	3	3	3
発熱			5	5	5	5
口渇			1	1	1	1
末梢腫脹			2	2	2	2
体調不良			2	2	2	2
一般・全身障害および投与部位の状態	3	3	19	24	22	27
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加			2	2	2	2
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加			2	2	2	2
血中ビリルビン増加			1	1	1	1
血中ナトリウム減少			1	1	1	1
血中トリグリセリド増加			1	1	1	1
白血球数増加			1	1	1	1
尿量減少			1	2	1	2
肝酵素上昇			2	2	2	2
肝機能検査値上昇			1	1	1	1
臨床検査			10	13	10	13
転倒			1	1	1	1
傷害、中毒および処置合併症			1	1	1	1
胃瘻造設術			1	1	1	1
機械的換気	1	1			1	1
外科および内科処置	1	1	1	1	2	2
寝たきり			1	1	1	1
社会環境			1	1	1	1
集計	12	16	102	136	113	152