



# 飲み薬

## 飲み薬の服用方法

### How to take oral medicines

\_\_日分の薬が処方されています。

These are medicines for \_\_ days.

□にチェックを入れましたので、それに従って服用してください。

Follow the directions indicated.

## このお薬の種類

### Type of medicine

内服剤です。

Internal medicine

舌下錠です。

Sublingual tablet

トローチです。

Lozenge

## 1回に服用する量

### Dose per administration

1/2：この表示がある時は、半分量を服用してください。

When indicated as 1/2, please take half the dose.

\_\_錠

\_\_ tablet(s)

\_\_カプセル

\_\_ capsule(s)

\_\_包

\_\_ pack(s)





# 飲み薬

## 服用する回数

Number of administrations

1日1回

Once a day

1日\_\_回

\_\_ times a day

2日に1回

Once in two days

1週間に1回

Once a week

## 服用する時期

When to take medicines

朝

In the morning

昼

In the afternoon

夜

In the evening

寝る前

At bedtime

起床時

Right after waking up

食前

Before meals

食後

After meals



# 飲み薬

食後 2 時間

2 hours after meals

\_\_ 時間毎

Every \_\_ hours

食直前

Right before meals

食直後

Right after meals

服用時注意してください。

Precautions

PTP 包装の薬剤は、PTP シートから取り出して服用してください。

Meds packed in single-dose, press-through sheets should be taken out of the packaging.

グラス 1 杯 (約 200mL) の水で服用してください。

Take the medicines with a glass (about 200 ml) of water.

(口中・舌下) に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

Put the medicines in the mouth/under the tongue to dissolve slowly, and do not chew.

(水・お湯) に溶かして服用してください。

Dissolve in water/ hot water before use.

よく振ってから服用してください。

Shake well before use.

乗り物に乗る 30 分前に服用してください。

Take the medicines 30 minutes before driving or riding any vehicle.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Keep out of reach of children.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Store in a cool place, away from moisture.



# 飲み薬

室温保存してください。

Keep at room temperature.

冷蔵庫の中で保存してください。

Store in the refrigerator.

冷凍庫に入れないでください。

Do not store in the freezer.

