



## 頓服薬の服用方法

### 頓복약의 사용방법

\_\_日分の薬が処方されています。

\_\_일분 약이 처방되어 있습니다.

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

□에 표시된 것에 따라서 복용하여 주십시오.

## 1 回に服用する量

### 1 회에 복용하는 양

1/2：この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2：이 표시가 있을 때는 분량의 반만 복용하여 주십시오.

\_\_錠

\_\_정

\_\_カプセル

\_\_캡셀

\_\_包

\_\_포

\_\_個

\_\_개

## 服用する回数

### 복용하는 횟수

適時

적시

医師の指示通り

의사의 지시대로

服用した後、次の使用まで\_\_時間空けてください。

복용 후 다음 사용시 까지 \_\_시간 간격을 두십시오.





服用の上限は1日\_\_回です。

복용상의 한계는 하루에 \_\_회입니다.

## 服用する時期

복용 시기

痛い時

아플 때

痒い時

가려울 때

下痢をしている時

설사를 하고 있을 때

心臓発作の時

심장발작 때

吐き気がある時

구역질이 날 때

咳が出る時

기침이 날 때

喘息発作の時

천식 발작시

痛風発作の時

통풍 발작시

痛風発作の予感がする時

통풍 발작이 예감될 때

熱が38.5℃以上ある時

열이 38.5℃ 이상 일 때

必要な時

필요할 때



服用時注意してください。

복용시 주의하여 주십시오.

PTP包装の薬剤は、PTPシートから取り出して服用してください。

PTP 포장의 약은 PTP 에서 꺼내어 복용하여 주십시오.

グラス1杯(約200mL)の水で服用してください。

컵 1 잔(약 200ml)의 물로 복용하여 주십시오.

(口中・舌下)に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

(입안 혀밑)에 넣어 씹지 말고 천천히 녹여 주십시오.

よく振ってから服用してください。

잘 흔들어 복용하여 주십시오.

子どもの手の届かないところに保存してください。

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

습기를 피하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.

室温保存してください。

실온에서 보관하여 주십시오.

冷蔵庫の中で保存してください。

냉장고 안에 보관하여 주십시오.

冷凍庫に入れないでください。

냉동실에는 넣지마십시오.

