



スプレー薬

スプレー薬の使用方法

분사식약의 사용방법

__日分の薬が処方されています。

__일분 약이 처방되어 있습니다.

□にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

□에 표시된 것에 따라서 사용하여 주십시오.

使用する部位

사용하는 부위

両鼻

양쪽 콧구멍

右鼻

오른쪽 콧구멍

左鼻

왼쪽 콧구멍

□

입

1回に使用する量

1회에 사용하는 양

1/2 : この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2 : 이 표시가 있을 때는 분량의 반만 사용하여 주십시오.

__押し

__누름

__秒

__초





スプレー薬

使用する回数

사용하는 횟수

1日1回

1일 1회

1日_回

1일 _회

1日数回

1일 수회

1日適時

1일 적시

使用する時期

사용 시기

朝

아침

昼

점심

夜

저녁

寝る前

취침 전

食前

식전

食後

식후

食後2時間

식후 2시간



スプレー薬

__時間毎

__시간 마다

使用时注意してください。

사용시 주의하여 주십시오.

よく振ってから使用してください。

잘 흔들어 사용하여 주십시오.

患部にスプレーしてください。

환부에 분사하여 주십시오.

鼻の中に噴霧してください。

코 안에 분사하여 주십시오.

鼻に使用する場合は、鼻をかんでから使用してください。

코 안에 사용하실 때는 코를 킂 후에 사용하여 주십시오.

鼻に使用する場合は、薬剤をスプレーしたとき鼻から吸い込んでください。

코 안에 사용하실 때는 약을 분사한 후 코로 흡입하여 주십시오.

吸入してください。

흡입하여 주십시오.

子どもの手の届かないところに保存してください。

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

습기를 피하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.

室温保存してください。

실온에서 보관하여 주십시오.

冷蔵庫の中で保存してください。

냉장고 안에 보관하여 주십시오.

冷凍庫に入れないでください。

냉동실에는 넣지마십시오.