



頓服薬の服用方法

Modo de usar dos remédios de uso esporádico

 ___日分の薬が処方されています。

Medicação para ___ dias.

 にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。Siga a indicação cujo se encontra assinalado.

1回に服用する量

Dosagem:

 1/2: この表示がある時は、半分量を使用してください。

Quando vier a indicação 1/2, use a metade.

 ___錠

____comprimido(s)

 ___カプセル

____cápsula(s)

 ___包

____pacotinho(s)

 ___個

____unidade(s)

服用する回数

Número de vezes que se deve tomar

 適時

Em horário próprio

 医師の指示通り

Conforme orientação médica

 服用した後、次の使用まで ___ 時間空けてください。

Abra um intervalo de ___ horas entre uma dose e outra.





服用の上限は 1 日__回です。

Tomar no máximo ____vez(s) ao dia.

服用する時期

Horário de administração do medicamento:

痛い時

Quando sentir dor

痒い時

Quando sentir coceira

下痢をしている時

Quando estiver com diarreia

心臓発作の時

Quando tiver um ataque de coração

吐き気がある時

Quando estiver com náuseas

咳が出る時

Quando estiver com tosse

喘息発作の時

Quando tiver crise de asma

痛風発作の時

Quando tiver crise de gota

痛風発作の予感がする時

Quando pressentir uma crise de gota

熱が 38.5℃以上ある時

Quando tiver mais de 38,5°C de febre

必要な時

Quando necessário



服用時注意してください。

Precauções relativas ao uso de medicamento:

PTP 包装の薬剤は、PTP シートから取り出して服用してください。

Os remédios com embalagem PTP devem ser ministrados após retirá-los das cartelas PTP.

グラス 1 杯（約 200mL）の水で服用してください。

Ingerir com 1 copo d'água (cerca de 200ml).

（口中・舌下）に含み、かまざにゆっくり溶かしてください。

Deixe dissolver lentamente sob ou sobre a língua sem mastigar.

よく振ってから服用してください。

Agite bem o frasco com a suspensão antes de ingerir.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Deve ser mantido fora do alcance das crianças.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Deve ser mantido em local fresco e sem umidade.

室温保存してください。

Deve ser armazenado à temperatura ambiente.

冷蔵庫の中で保存してください。

Deve ser armazenado dentro da geladeira.

冷凍庫に入れないでください。

Não deve pôr no congelador

