



飲み薬

飲み薬の服用方法

Modo de usar dos remédios via oral.

__日分の薬が処方されています。

Medicação para ____ dias.

にチェックを入れましたので、それに従って服用してください。

Siga a indicação cujo se encontra assinalado.

このお薬の種類

Especificação do remédio:

内服剤です。

De uso interno.

舌下錠です。

Para pôr sob a língua.

トローチです。

Pastilha.

1回に服用する量

Dosagem:

1/2：この表示がある時は、半分量を服用してください。

Quando vier a indicação 1/2, ingerir a metade.

__錠

__comprimido(s)

__カプセル

__cápsula(s)

__包

__pacotinho(s)





飲み薬

服用する回数

Número de vezes que deve tomar

1日1回

1 vez ao dia

1日__回

___vezes ao dia

2日に1回

1 vez a cada 2 dias

1週間に1回

1 vez por semana

服用する時期

Horário de administração do medicamento:

朝

De manhã

昼

Ao meio-dia

夜

À noite

寝る前

Antes de dormir

起床時

Assim que acordar

食前

Antes das refeições

食後

Após as refeições



飲み薬

- 食後 2 時間

2 horas após as refeições

- __ 時間毎

A cada ____ horas

- 食直前

Imediatamente antes da refeição

- 食直後

Logo após a refeição

服用時注意してください。

Precauções relativas ao uso de medicamento:

- PTP 包装の薬剤は、PTP シートから取り出して服用してください。

Os remédios com embalagem PTP devem ser ministrados após retirá-los das cartelas PTP.

- グラス 1 杯 (約 200mL) の水で服用してください。

Ingerir com 1 copo d'água (cerca de 200ml).

- (口中・舌下) に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

Deixe dissolver lentamente sob ou sobre a língua sem mastigar.

- (水・お湯) に溶かして服用してください。

Ingerir dissolvido em água (fria ou quente).

- よく振ってから服用してください。

Agite bem o frasco com a suspensão antes de ingerir.

- 乗り物に乗る 30 分前に服用してください。

Ingerir 30 minutos antes de tomar alguma condução.

- 子どもの手の届かないところに保存してください。

Deve ser mantido fora do alcance das crianças.

- 湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Deve ser mantido em local fresco e sem umidade.



飲み薬

- 室温保存してください。

Deve ser armazenado em local fresco à temperatura ambiente.

- 冷蔵庫の中で保存してください。

Deve ser armazenado dentro da geladeira.

- 冷凍庫に入れないでください。

Não deve pôr no congelador

