



貼り薬の使用方法

Modo de usar dos remédios de uso externo (Tipo compressa adesiva)

 ___日分の薬が処方されています。

Medicação para ___ dias.

 にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。Siga a indicação cujo se encontra assinalado.

貼る部位

Local de aplicação:

 患部

Na área lesada

 胸

No peito

1回に貼る枚数

Quantidade a ser aplicada por vez:

 1/2 : この表示がある時は、半分量を使用してください。

Quando vier a indicação 1/2, aplicar a metade.

 ___枚

___compressa(s)

 ___錠

___comprimido(s)



貼り替える回数

Número de vezes que deve trocar a compressa adesiva

 1日1回

1 vez ao dia

 1日__回

___vezes ao dia

 1日数回

Várias vezes ao dia

 1日適時

Em horários próprios

 2日に1回

1 vez a cada 2 dias

 1週間に1回

1 vez por semana

貼る時期

Horário de administração do medicamento:

 朝

De manhã

 昼

Ao meio-dia

 夜

À noite

 寝る前

Antes de dormir

 食前

Antes das refeições

 食後

Após as refeições

 食後2時間

2 horas após as refeições

 時間毎

A cada ____ horas



貼る時注意してください。

Precauções relativas ao uso de medicamento:

 薬面のフィルムをはがして貼ってください。

Antes de aplicar, retire o filme protetor da parte adesiva.

 ガーゼに延ばして貼ってください。

Aplique a parte adesiva sobre uma gaze, não diretamente sobre a pele.

 患部に貼ってください。

Aplique sobre a área lesada.

 指示された部位に貼ってください。

Aplique sobre a área recomendada pelo médico.

 子どもの手の届かないところに保存してください。

Deve ser mantido fora do alcance das crianças.

 湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Deve ser mantido em local fresco e sem umidade.

 室温保存してください。

Deve ser armazenado à temperatura ambiente.

 冷蔵庫の中で保存してください。

Deve ser armazenado dentro da geladeira.

 冷凍庫に入れないでください。

Não deve pôr no congelador