



点眼・点耳・点鼻

点眼薬・点耳薬・点鼻薬の使用方法

Direksyon sa paggamit ng pamahid sa mata / pamahid sa tenga / pamahid sa ilong

__日分の薬が処方されています。

Para sa ___ araw ang gamot na ito.

にチェックを入れましたので、それに従って使用してください。

Nilagyan ang check sa , kaya't gamitin ang gamot ayon sa direksyon.

使用する部位

Bahagi sa paggamit

両 (目・耳・鼻)

kapwa (mata • tenga • ilong)

右 (目・耳・鼻)

kanan (mata • tenga • ilong)

左 (目・耳・鼻)

kaliwa (mata • tenga • ilong)

1 回に使用する量

Dami ng paggamit sa isang beses

1/2 : この表示がある時は、半分量を使用してください。

1/2 : Tungkol sa direksyong ito, gamitin ang kalahating dami.

__滴


___ patak

__本

___ piraso

__mm

___ mm





点眼・点耳・点鼻

使用する回数

Kadalasan ng paggamit

1日1回

isang beses sa isang araw

1日__回

___ beses sa isang araw

1日数回

ilang beses sa isang araw

1日適時

tamang-tama sa oras sa isang araw

使用する時期

Oras ng paggamit

朝

sa umaga

昼

tangahali

夜

gabi

寝る前

bago matulog

食前

bago kumain

食後

pagkatapos ng pagkain

食後2時間

pagkadalawang oras pagkakain



点眼・点耳・点鼻

__時間毎

kada ___ oras

使用时注意してください。

Mag-ingat ka sa paggamit.

飲んではいけません。

Huwag kang uminom.

よく振ってから使用してください。

Alugin ang bote nang mabuti bago gumamit.

コンタクトレンズを外して点眼してください。

Ilaglag mo ang pamahid sa mata pagkaalis ng contact lenses.

コンタクトレンズ装着時にも点眼できます。

Maaari mong ilaglag ang pamahid sa mata kahit na isuot ang contact lenses.

点耳薬を使用する場合は、綿棒で耳掃除をしたあと使用してください。

Gamitin ang pamahid sa tenga pagkalinis mo ng tenga sa pamamagitan ng pamahid.

使用する前に、薬を手のひらで握って少し暖めてください。

Magpainit ng gamot nasa kamay bago gamitin.

子どもの手の届かないところに保存してください。

Mag-ingat kang magpreserba ng gamot mula sa mga bata.

湿気を避け、涼しい場所で保存してください。

Layuan mo ang basa-basa at magpreserba ng gamot na ito sa malamig na lugar.

室温保存してください。

Magpreserba ng gamot na ito sa normal na temperatura.

冷蔵庫の中で保存してください。

Ilagay ang gamot na ito sa repridyereytor.

冷凍庫に入れないでください。

Huwag mong ilagay ang gamot sa freezer.